

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения
ВИТАПРОСТ®

Регистрационный номер P N001136/01

Торговое название препарата Витапрост®

Международное непатентованное название Простаты экстракт

Лекарственная форма Суппозитории ректальные

Состав:

Один суппозиторий содержит:

действующее вещество: простаты экстракт – 50 мг, в пересчете на водорастворимые пептиды – 10 мг;

основы для суппозиторияев: жир твёрдый (Витепсол, марки H 15, W 35, Суппосир, марки NA 15, NAS 50) – достаточное количество до получения суппозитория массой 1,25 г.

Описание

Суппозитории от белого до белого с желтоватым или серовато-буроватым оттенком цвета, торпедообразной формы.

Фармакотерапевтическая группа

Средство лечения хронического простатита

Код АТХ: G04BX

Фармакологические свойства

Витапрост® обладает органотропным действием на предстательную железу. Уменьшает степень отека, лейкоцитарной инфильтрации предстательной железы, нормализует секреторную функцию эпителиальных клеток, увеличивает число лецитиновых зерен в секрете ацинусов, стимулирует мышечный тонус мочевого пузыря. Улучшает микроциркуляцию в предстательной железе за счет уменьшения тромбообразования, антиагрегантной активности, препятствует развитию тромбоза венул в предстательной железе.

Витапрост® нормализует параметры предстательной железы и эякулята. Уменьшает боль и дискомфорт, устраняет дизурические явления, улучшает копулятивную функцию.

Показания к применению

Хронический простатит, состояния до и после оперативных вмешательств на предстательной железе.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы

Ректально, по 1 суппозиторию после самопроизвольного опорожнения кишечника

или клизмы 1 раз в день. После введения суппозитория желательно пребывание пациента в постели в течение 30-40 минут. Длительность курса лечения препаратом Витапрост® - не менее 10 дней.

Побочное действие

Аллергические реакции.

Передозировка

О случаях передозировки препарата Витапрост® не сообщалось.

Особые указания

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Препарат не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в том числе управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами).

Форма выпуска

Суппозитории ректальные 10 мг. 5 суппозитория в контурной ячейковой упаковке из пленки поливинилхлоридной или пленки поливинилхлоридной, ламинированной полиэтиленом. Одну или две контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по медицинскому применению препарата помещают в пачку из картона.

Срок годности

2 года. Не использовать препарат после истечения срока годности.

Условия хранения

В недоступном для детей месте, при температуре не выше 20°C.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Наименование и адрес юридического лица, на имя которого выдано регистрационное удостоверение/ **Производитель/** **Организация, принимающая претензии**

ОАО «Нижфарм», Россия

603950, г. Нижний Новгород,

ГСП-459, ул. Салганская, д. 7

Тел.: (831) 278-80-88

Факс: (831) 430-72-28

Интернет: <http://www.nizhpharm.ru>