

**ИНСТРУКЦИЯ**  
**по применению лекарственного препарата для медицинского применения**  
**ВИТАПРОСТ® ФОРТЕ**

**Регистрационный номер:** ЛС-002488

**Торговое название препарата:** Витапрост® Форте

**Лекарственная форма:** суппозитории ректальные

**Состав:**

Один суппозиторий содержит:

*активное вещество:* простаты экстракт – 100 мг в пересчете на водорастворимые пептиды – 20 мг;

*вспомогательное вещество:* жир твердый (Витепсол, марки Н 15, W 35; суппосир, марки NA 15, NAS 50) – достаточное количество до получения суппозитория массой 1,25 г.

**Описание:**

Суппозитории белого с желтоватым, кремоватым или сероватым оттенком цвета, торпедообразной формы. Допускается появление белого налета на поверхности суппозитория.

**Фармакотерапевтическая группа:**

Простатита хронического средство лечения

**Код АТХ:** G04BX.

**Фармакологическое действие**

Витапрост® Форте обладает органотропным действием на предстательную железу. Уменьшает степень отека, лейкоцитарной инфильтрации предстательной железы, нормализует секреторную функцию эпителиальных клеток, увеличивает число лецитиновых зерен в секрете ацинусов, стимулирует мышечный тонус мочевого пузыря. Улучшает микроциркуляцию в предстательной железе за счет уменьшения тромбообразования, антиагрегантной активности, препятствует развитию тромбоза венул в предстательной железе.

На основании данных клинических исследований доказано, что Витапрост® Форте умеренно уменьшает объем предстательной железы. Препарат уменьшает выраженность обструктивной и ирритативной симптоматики при доброкачественной гиперплазии предстательной железы, что выражается в увеличении максимальной и средней объемных скоростей потока мочи и уменьшении объема остаточной мочи.

Витапрост® Форте улучшает микроциркуляцию крови в стенке мочевого пузыря за счет расширения неповрежденных сосудов (эффект вазодилатации), этим способствует восстановлению доставки кислорода в ткани, испытывающие гипоксию, что стимулирует физиологическую репарацию. Оказывает противовоспалительное действие за счет улучшения процессов трофики стенки мочевого пузыря и стимуляции регенераторных процессов.

Активации органного кровотока способствует улучшению адаптационной и сократительной активности детрузора, увеличивая емкость мочевого пузыря.

Снижением ишемии детрузора можно объяснить выраженное снижение гиперактивности мочевого пузыря, которое продолжается и после окончания применения Витапрост® Форте.

Витапрост® Форте способствует нормализации параметров предстательной железы и эякулята. Уменьшает боль и дискомфорт, устраняет дизурические явления, улучшает копулятивную функцию.

**Показания к применению**

Хронический простатит.

Доброкачественная гиперплазия предстательной железы.

Лечение ургентного (императивного) недержания мочи, ургентных (императивных) позывов к мочеиспусканию и учащенного мочеиспускания при неосложненных формах гиперактивности мочевого пузыря у женщин в климактерическом и постклимактерическом периодах.

Состояния до и после оперативных вмешательств на предстательной железе.

### **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

### **Способ применения и дозы**

Ректально. По 1 суппозиторию после самопроизвольного опорожнения кишечника или очистительной клизмы 1 раз в день. После введения желательное пребывание пациента в постели в течение 30-40 минут.

Продолжительность курса лечения определяет лечащий врач. Минимальная продолжительность курса лечения препаратом Витапрост® Форте при доброкачественной гиперплазии предстательной железы – 15 дней, при хроническом простатите – 10 дней, при гиперактивном мочевом пузыре – 20 дней.

### **Побочное действие**

Крайне редко - аллергические реакции.

### **Передозировка**

О случаях передозировки препарата Витапрост® Форте не сообщалось.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Случаи взаимодействия или несовместимости с другими лекарственными средствами не описаны.

### **Влияние на способность к управлению транспортными средствами и механизмами**

Не влияет на способность управлять транспортными средствами и другими механизмами.

### **Форма выпуска**

Суппозитории ректальные 20 мг. По 5 суппозиториев в контурной ячейковой упаковке. Одну или две контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по медицинскому применению препарата помещают в пачку картонную.

### **Условия хранения**

При температуре не выше 20 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

### **Срок годности**

3 года.

Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

### **Условия отпуска**

Без рецепта.

### **Наименование и адрес юридического лица, на имя которого выдано регистрационное удостоверение/Производитель/Организация, принимающая претензии**

ОАО «НИЖФАРМ», Россия

603950, г. Нижний Новгород

ГСП-459, ул. Салганская, 7

тел (831) 278-80-88

факс (831) 430-72-28

Интернет: <http://www.nizhpharm.ru>